МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ МОЯ НАУКА
www.naykalab.ru

Образец

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Аллергологические исследования			
[2616] RIDA-2 (респираторная панель)	результат:		
Кролик (эпителий) IgE	0,55	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	
Кошка - шерсть	5,1	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Морская свинка - эпителий (E6)	3,2	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	
Хомяк - эпителий (E84)	19,1	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Клещ D.Pteronyssinus (D1)	0,6	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	
Клещ D.Farinae (D2)	1,8	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Полынь обыкновенная (W6)	2,3	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	
Подорожник ланцетный (W9)	4,1	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Береза (Т3)	1,9	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	
Дуб (Т7)	0,1	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Лещина (T4)	0,1	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	
Ольха серая (T2)	0,4	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Alternaria alternata (M6)	0,1	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	
Aspergillus fumigatus (M3)	0,1	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Penicillium notatum (M1)	0,5	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	
Cladosporium herbarum (M2)	0,1	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Рожь (пыльца)	0,46	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	
Смесь трав - пыльца (Gx)	0,4	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Собака - шерсть	3,8	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	
Метод определения: Иммуноферментный анализ			
Лошадь - перхоть (E3)	6,3	<0,35 kU/l (Класс 0) Специфические IgE-антитела не определяются 0,35 - 0,7 kU/l (Класс 1) Очень низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки часто отсутствуют 0,7 - 3,5 kU/l (Класс 2) Низкий уровень специфических IgE-антител, при наличии сенсибилизации клинические признаки могут присутствовать 3,5 - 17,5 kU/l (Класс 3) Четкое наличие специфических IgE-антител, клинические признаки сенсибилизации обычно присутствуют 17,5 - 50 kU/l (Класс 4) Высокий уровень специфических IgE-антител, клинические сенсибилизации почти всегда присутствуют 50 - 100 kU/l (Класс 5) Очень высокий уровень IgE-антител. >100 kU/l (Класс 6) Исключительно высокий уровень специфических IgE-антител	