МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ МОЯ НАУКА
www.naykalab.ru

Образец

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Профиль			
[1241] Онкопрофилактика для женщин			
[223] РЭА (раковоэмбриональный антиген)	96,2	0 - 5.0 нг/мл	
[237] Индекс ROMA (алгоритм расчёта риска эпителиального рака яичников)	2,79	< 7.4%. Расчет ROMA выполнен по алгоритму для пременопаузы	
HE4	21,3	пременопауза < 70 пмоль/л постменопауза < 140 пмоль/л	
CA-125 (яичники)	2,1	0.00 – 35.00 (Е/мл)	
[224] CA 15 - 3 (молочная железа)	-	<35 Е/мл	
Анализатор: Roche Hitachi cobas e 411			
Анализатор: MAGLUMI 2000			
[501] Общий анализ крови (полный)(СОЭ,Le,Er,Hb,L-формула, тромбоциты, эритроциты)	результат:		
гипохромия эритроцитов (+), анизоцитоз эритроцитов (+), пойкилоцитоз эритроцитов (+), микроцитоз эритроцитов (+)			
MO моноциты	5	1,7-9,3%	
Базофилы	0	0-1%	
LY лимфоциты	29	дети:25-60 % взрослые:18-40%	
GR гранулоциты	65	42,2 - 75,2%	
MO моноциты	5	0-10 %	
MO# абсолютное содержание моноцитов	0,6	0,1 - 0,6 x 10^9\л	
Тромбоциты (PLT)	182	150 - 450 x 10^9\л	
Тромбокрит (PCT)	0,20	0,19 - 0,36 %	
Ср. объем тромбоцита (MPV)	8,1	6,5 - 12,0 fL	
Средний объем эритроцита (MCV)	76,7	76 - 96,9 fL	
Гематокрит (HCT)	41,3	35 - 48%	
Гемоглобин (HGB)	147	до1 года: 110 - 130 г\л 1-10 лет: 115 - 148 г\л мужчины: 132 - 164 г\л женщины: 115 - 145 г\л	
СОЭ по Вестергрену	8	1-12 мес: 2 - 14 мм\ч 1-10 лет: 1 - 10 мм\ч 10 - 50 лет женщины : 1 - 20 мм\ч мужчины : 1 - 15 мм\ч > 50 лет женщины : 1 - 30 мм\ч мужчины: 1 - 20 мм\ч	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Эритроциты (RBC)	3,95	до 2 нед.: 3,9 - 5,9 x 10^12\л 0,5-1 мес.: 3.3 - 5.3 x 10^12\л 1-4 мес.: 3.5 - 5.1 x 10^12\л 4-6 мес.: 3.9 - 5.5 x 10^12\л 6-9 мес.: 4.0 - 5.3 x 10^12\л 9-12 мес.: 4.1 - 5.3 x 10^12\л 1-3 года 3.8 - 4.8 x 10^12\л 3-6 лет 3.7 - 4.9 x 10^12\л 6 - 9 лет: 3,8 - 4,9 x 10^12\л 9 - 12 лет: 3,9 - 5,1 x 10^12\л мужчины: 12-15 лет 4.1 - 5.2 x 10^12\л 15-65 лет 4.2 - 5.6 x 10^12\л > 65 лет 3.8 - 5.2 x 10^12\л женщины: 12-15 лет 3.8 - 5.0 x 10^12\л 15-65 лет 3.9 - 5.3 x 10^12\л > 65 лет 3.8 - 5.2 x 10^12\л	
RDW анизоцитоз	11,9	11,6 - 16,4 %	
RDWa Ширина распределения эритроцитов в абсолютных значениях	58,9	30.0-150.0	
Ширина распред. тромбоцитов (PDW)	15,5	15,5 - 17,1	
LPCR Макротромбоциты	18,8	0,1-99,9%	
WBC лейкоциты	4,9	до1 года: 6,0 - 17,5 x 10^9\л 1-4 года: 5,5 - 15,5 x 10^9\л 4-19 лет: 4,5 - 13,5 x 10^9\л взрослые: 4,50 - 9,00 x 10^9\л	
Ср. содержание гемоглобина (MCH)	27,6	27 - 33 pg	
Ср. конц. гемоглобина в эр. (MCHC)	324	310 - 370 г\л	
LY# абсолютное содержание лимфоцитов	1,4	1,2 - 3,4 x 10^9\л	
GR# абсолютное содержание гранулоцитов	3,2	1,4 - 6,5 x 10^9\л	
MO# абсолютное содержание моноцитов	0,6	0,1-0,6x10^9\л	
Эозинофилы	0	дети: 0,5-7% взрослые:0-5%	
миелоциты (нейтрофилы%)	0	0%	
юные (нейтрофилы%)	0	0%	
Нейтрофилы: палочк.(микроскопия)	1	1-6%	
Нейтрофилы: сегмент.(микроскопия)	64	дети:25-65% взрослые:45-70%	
Тест система: РеалБест РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, серия 9559, срок годности 22.10.2022			
[727] Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (технология BD SurePath™)	результат:		
Плоскоклеточная карцинома			
Другие злокачественные опухоли			
Атипичные железистые клетки неясного значения (Atypical glandular cells of undetermined significance AGUS)	не обнаружено	не обнаружены	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Эндоцервикальная аденокарцинома in situ (AIS)	не обнаружено	не обнаружена	
Дополнительные уточнения	В полученном материале клетки с признаками злокачественности не выявлены. Флора смешанная.	не обнаружена	
Адекватность образца	Качество препарата адекватное.		
Цитологическое описание	Клетки зоны трансформации присутствуют. В полученном материале обнаружены клетки плоского эпителия поверхностного, промежуточного слоев и цилиндрического эпителия. Умеренно выраженная лейкоцитарная инфильтрация.		
Доброкачественные изменения эпителия (дегенеративные, репаративные изменения, гиперкератоз, паракератоз и др.)	не обнаружено	не обнаружены	
Патологические изменения			
Атипичные клетки плоского эпителия неясного значения (Atypical squamous cells undetermined significance ASC-US)	не обнаружено	не обнаружены	
Клетки плоского эпителия с атипией неясного значения, не исключающие HSIL (Atypical squamous cells of undetermined significance cannot exclude HSIL (ASC-H))	не обнаружено	не обнаружены	
Плоскоклеточное интраэпителиальное поражение низкой степени (Low grade squamous intraepitelial lesion LSIL)	не обнаружено	не обнаружено	
Плоскоклеточное интраэпителиальное поражение высокой степени (High grade squamous intraepitelial lesion HSIL)	не обнаружено	не обнаружено	
Карцинома in situ (Carcinoma in situ CIS)	не обнаружено	не обнаружена	
[45] Папилломавирус генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) (колич.)	5,25	Копий ДНК ВПЧ/100 000 клеток (lgДНК/10^5кл - количество генотипов ДНК ВПЧ на 100000 клеток человека) < 3 - клинически малозначимая; 3 - 5 - клинически значимая (риск развития дисплазии); > 5 - клинически значимая повышенная (высокий риск развития дисплазии)	
гипохромия эритроцитов (+), анизоцитоз эритроцитов (+), пойкилоцитоз эритроцитов (+), микроцитоз эритроцитов (+)			
ДНК ВПЧ 16 типа	2,0		
ДНК ВПЧ 18 типа	не обнаружено		
ДНК ВПЧ 31 типа	0		
ДНК ВПЧ 33 типа	0		

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
ДНК ВПЧ 35 типа	0		
ДНК ВПЧ 39 типа	0		
ДНК ВПЧ 45 типа	0		
ДНК ВПЧ 51 типа	0		
ДНК ВПЧ 52 типа	0		
ДНК ВПЧ 56 типа	0		
ДНК ВПЧ 58 типа	0		
ДНК ВПЧ 59 типа	не обнаружено		
гемоглобин	не обнаружено	не обнаружено	
кетоны (KET)	не обнаружено	не обнаружено	
нитриты (NIT)	не обнаружено	не обнаружено	
билирубин (BIL)	не обнаружено	не обнаружено	
уробилиноген (UBG)	3,4	3,4 - 17,0 мкМ\л	
слизь (MUC)	не обнаружено	не обнаружено	
соли	не обнаружено	не обнаружено или единичные кристаллы	
бактерии (BAC)	не обнаружено	не обнаружено	
дрожжевые грибки (YEA)	не обнаружено	не обнаружено	