

Образец

КДЛ			
[16047] Эозинофильный нейротоксин (EDN) в кале	0,08	<0,36 мкг/г	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Комментарий	Отсутствие таких частых серологических показателей...	Выявление эозинофильного нейротоксина в стуле представляет собой тест количественного определения эозинофильного катионного гликопротеина (эозинофильный протеин X, EDN, EPX, RNASE2) в кале, входящий в состав вторичных эозинофильных гранул, обладающий цитотоксическим и нейротоксическим действием, а также противовирусной и противопаразитарной активностью (Achaḡa K. R. et al., 2014). Определение содержания эозинофильного нейротоксина в стуле может служить маркером текущего клинического или субклинического хронического воспаления и повышенной проницаемости кишечника, а также для определения элиминационной диеты при пищевой непереносимости (Rosa M. et al., 2017). Нормальное содержание фекального эозинофильного нейротоксина с большой вероятностью снижает, однако полностью не исключает вероятность заболеваний, сопровождающиеся эозинофильной инфильтрацией стенки кишечника, включая эозинофильный энтероколит при не-IgE-опосредованной аллергической реакции к белкам коровьего молока (в 72% случаев), и другие виды пищевой аллергии, а также воспалительные заболевания кишечника, паразитарные инвазии и целиакию. Нормальные значения содержания эозинофильного нейротоксина в стуле могут отмечаться при эозинофильной инфильтрации верхних отделов желудочно-кишечного тракта, включая эозинофильный гастроэнтерит и эозинофильный эзофагит, а также могут свидетельствовать об успешном проведении элиминационной диеты при пищевой аллергии. При проведении дифференциальной диагностики воспалительного процесса в кишечнике рекомендуется сочетанное определение содержания эозинофильного	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
		нейротоксина в кале, фекального кальпротектина, гемоглобина и гемоглобин-гаптоглобинового комплекса в стуле. Комментарии к заявке: Локализация: Кал	