

Образец

ИФА			
[239] Биомаркеры рака простаты: PCA3 и TMPRSS2-ERG, моча (Prostate cancer biomarkers: PCA3 and TMPRSS2-ERG, urine)	результат:		
Комментарий	Информация по интерпретации: - индекс PCA3<25 и отсутствие транслокации TMPRSS2-ERG свидетельствует о низкой вероятности обнаружения рака предстательной железы по результатам биопсии; - индекс PCA3 в диапазоне от 25 до 35 представляет собой "серую зону", которую следует интерпретировать с осторожностью в связи с возможной вариативностью; - индекс PCA3>35 и/или наличие транслокации TMPRSS2-ERG свидетельствует о повышенной вероятности обнаружения рака предстательной железы при биопсии.		
индекс "PCA3"	11	<35 См. дополнительные комментарии по интерпретации	
Транслокация "TMPRSS2- ERG"	не обнаружено		

У пациента не было обнаружено мутаций del52bp (мутация типа 1) и insTTGTC (мутация типа 2) в гене CALR. Данный результат не исключает у пациента миелопролифератных заболеваний, таких как эссенциальная тромбоцитемия и миелофиброз. Отрицательный результат может наблюдаться при низкой концентрации мутации в крови, либо в случаях тройного-негативного фенотипа миелопролиферативных заболеваний (JAK2, CALR, MPL-негативные). При отрицательном результате на данное исследование рекомендуется проведение исследования мутаций в гене JAK2, а также в гене MPL, если тесты не были проведены ранее.