

Образец

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Профиль			
[1321] Для спортсменов			
[2.9.1] Эхокардиография	-		
ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ	из парастернальной позиции мм; из апикальной позиции мм x мм. Объем мл		
ПРАВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК	мм		
BSA	m2, рост см, масса тела кг		
Датчик:	Секторный фазированный датчик 1-5 МГц Монокристалльный конвексный датчик SC6-1s (192 элемента, радиус 60) 1.2-6.0МГц Линейный датчик L14-3Ws (256 элементов, апертюра 55.5) 3.0-14.0МГц Монокристалльный секторный фазированный датчик SP5-1s (линейный размер рабочей поверхности 23.4 мм, 80 элементов) 1,5-5,0МГц Внутриполостной датчик V11-3Hs (192 элемента, радиус 11) 3.0-11.0МГц Конвексный монокристалльный датчик для объемного сканирования в реальном времени SD8-1s (рад. кривизны 45 мм, 192 элемента) 1.8-8.2МГц Конвексный датчик C5-1U (1.2-6.0МГц, 128 элементов, радиус 60) Линейный датчик L9-3U (2.5-9.0МГц, 192 элемента, апертюра 43.6) Монокристалльный секторный фазированный датчик SP5-1U (1.5-4.5МГц, 23.4 мм, 80 элементов) Внутриполостной датчик V11-3HU (3.0-11.0МГц, 192 элемента, радиус 11) Линейный датчик Mindray L14-3WE Секторный фазированный датчик Mindray SP5-1E Конвексный датчик Mindray SC6-1E Микроконвексный внутриполостной датчик Mindray V11-3HE		

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	Атеросклероз аорты с дегенеративными изменениями аортального клапана. Недостаточность аортального клапана 1 степени. Недостаточность митрального клапана степени. Недостаточность трикуспидального клапана степени. Незначительная гипертрофия стенок левого желудочка. Нарушение диастолической функции левого желудочка 1 степени. Дилатация левого предсердия. Легочная гипертензия. Экстрасистолия. Нарушение локальной сократимости левого желудочка с сохраненной глобальной сократимостью (ФВ по Симпсону %). Без нарушения внутрисердечной гемодинамики.		
Аппарат УЗИ:	Система ультразвуковая диагностическая APLIO 500 new 7.0 Аппарат ультразвуковой диагностический F37 (ALOKA) Аппарат ультразвуковой диагностический ALOKA PROSOUND α 6 Premier Аппарат ультразвуковой диагностический DC-8 Exp (Mindray) Прибор цифровой ультразвуковой диагностический DC-3 (Mindray) Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq P5(GE) Система ультразвуковая диагностическая медицинская серии Logiq F6 (GE) Система ультразвуковая диагностическая DC-60 Pro X-Insight (Mindray) Система ультразвуковая диагностическая DC-80 X-Insight (Mindray) Система ультразвуковая диагностическая X7 (Mindray) Система ультразвуковая диагностическая HM70A Samsung Диагностическая ультразвуковая система Mindray Imagyn I9 Ультразвуковая система Mindray Resona 6 УЗИ Аппарат Mindray DC-90 X-Insight		

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Описание проведенного исследования	BSA - м2, рост см, масса тела кг ЧСС уд. в минуту. Визуализация удовлетворительная. АОРТА: стенки не изменены, гиперэхогенны, уплотнены, утолщены, базальное кольцо мм, на уровне синусов Вальсальвы мм, восходящая мм, нисходящая мм, пиковый градиент давления в нисходящей аорте мм рт.ст. ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ: из парастернальной позиции мм; из апикальной мм х мм; объем мл, индекс объема мл/м2 ПРАВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ: из апикальной позиции мм х мм; объем мл, индекс объема мл/м2 ПРАВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК: мм ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК: МЖП: толщина в диастолу мм, в систолу мм Задняя стенка: толщина в диастолу мм, в систолу мм КДР мм; КСР мм; КДО мл; КСО мл; УО мл ФВ %; ФУ %; ММЛЖ г РЕГИОНАЛЬНАЯ СОКРАТИМОСТЬ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА: не нарушена, зон гипокинезии и акинезии нет. Септальных дефектов не выявлено. ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИЯ: диаметр ствола мм ЛЕГОЧНЫЙ КЛАПАН: створки клапана легочной артерии не изменены, градиент давления мм рт.ст. Регургитация: 1 степени АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН: три створки, не изменены, гиперэхогенны, неравномерно утолщены, уплотнены, в раскрытии не ограничены, пиковый градиент давления мм рт.ст. Регургитация: нет 1 степени, узкий центральный поток, малый объем, vena contracta мм МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН: диастолическое движение створок разнонаправленное, в противофазе, раскрытие достаточное. Створки митрального клапана: не изменены утолщены, уплотнены Регургитация: 1 степени минимальная, подклапанная, vena contracta мм, объем потока регургитации мл Е/А - ТРИКУСПИДАЛЬНЫЙ КЛАПАН: створки трикуспидального клапана не изменены Регургитация: 1 степени,		

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
	vena contracta мм, объем потока регургитации мл Систолический градиент регургитации мм рт.ст. Расчетное давление в легочной артерии мм рт.ст. НАЛИЧИЕ ПЕРИКАРДИАЛЬНОГО ВЫПОТА: в пределах нормы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: НПВ не расширена, коллабирует на вдохе более 50 %		
АОРТА	стенки не изменены, гиперэхогенны, уплотнены, утолщены, базальное кольцо мм, на уровне синусов Вальсальвы мм, восходящая мм, нисходящая мм, пиковый градиент давления в нисходящей аорте мм рт.ст. Кровоток в брюшной аорте магистральный.		
Направительный диагноз МКБ-10	Z00.0: Общий медицинский осмотр		
ЧСС	уд. в минуту		
Региональная сократимость левого желудочка	не нарушена, зон гипокинезии и акинезии нет. Септальных дефектов не выявлено.		
ЛЕГОЧНЫЙ КЛАПАН	створки клапана легочной артерии не изменены, градиент давления мм рт.ст. Регургитация: 1 степени		
МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН	диастолическое движение створок противоположное, раскрытие достаточное. Створки митрального клапана: не изменены утолщены, уплотнены Регургитация: нет 1 степени, минимальная, подклапанная Е/А -		
ПРАВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ	из апикальной позиции мм х мм		
ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК	МЖП: толщина в диастолу мм, толщина в систолу мм Задняя стенка: толщина в диастолу мм, толщина в систолу мм КДР мм; КСР мм; КДО мл; КСО мл; УО мл ФВ %; ФУ %; ММЛЖ г		
ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИЯ	диаметр ствола мм		
АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН	три створки, не изменены, гиперэхогенны, неравномерно утолщены, уплотнены, в раскрытии не ограничены, пиковый градиент давления мм рт.ст. Регургитация: нет 1 степени, узкий центральный поток, малый объем, vena contracta мм		

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
ТРИКУСПИДАЛЬНЫЙ КЛАПАН	створки трикуспидального клапана не изменены утолщены, уплотнены Регургитация: 1 степени Систолический градиент регургитации мм рт.ст. Расчетное давление в легочной артерии мм рт.ст. НАЛИЧИЕ ПЕРИКАРИАЛЬНОГО ВЫПОТА: нет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: НПВ не расширена, коллабирует на вдохе более 50 %.		
[1.1.1] Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта	-		
Анамнез заболевания, жизни	Аллергологический анамнез: неотягощен. Семейный анамнез: неотягощен. ВИЧ-инфекция: отрицает. Туберкулез: отрицает. Оперативное вмешательство: Гемотрансфузии: Перенесенные заболевания: Считает себя больным(ой) с		
Группа здоровья	Определяется в ЛПУ по месту жительства		
Лист нетрудоспособности, справка	Временно нетрудоспособен. Трудоспособен. Нуждается в выдаче ЭЛН с по . Явка на прием		
Сопутствующее заболевание	M46.1 - Артроз крестцово-подвздошного сочленения		
Внешняя причина при травмах (отравлениях) код МКБ	-----		
Диспансерная группа	Определяется в ЛПУ по месту жительства		
Объективные данные	Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Поведение: активное. Носовое дыхание свободное. Зев: слизистая-бледно-розового цвета. Температура тела: - Пульс: уд/мин. АД (мм.рт.ст) ЧДД- в мин. Вес: Рост: Кожные покровы и слизистые оболочки бледно-розового цвета. В легких дыхание везикулярное, равномерно проводится по всем легочным полям, хрипов нет. Тоны сердца: ясные ритмичные, патологических шумов нет. Живот округлой формы, мягкий, безболезненный. Лимфатические узлы: пальпируются не увеличены. Отеки на конечностях: отсутствуют. Мочеиспускание без дизурии. Стул регулярный, оформленный. ЛОКАЛЬНЫЙ СТАТУС:		
Диагноз основного заболевания	Хронический риносинусит? Аллергический ринит?		

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Осложнения	Астенический синдром.		
Код МКБ10 по сопутствующему диагнозу	J34.2, J30.0		
Назначение (исследований, консультаций)	- через 3 месяца кровь на мочевины, креатинин, мочевую кислоту, АлАТ, АсАТ, КФК, ГГТ, липидный профиль - консультация эндокринолога - консультация ревматолога - консультация гастроэнтеролога - консультация гематолога - консультация нефролога		
Жалобы	на периодическое снижение слуха на оба уха, периодический шум в ушах в течение 2 месяцев. В течение последней недели отметил постоянный характер шума в ушах (по типу "гула"), усиление шума слева, снизилась разборчивость речи обоими ушами. Последние 2 дня отмечает легкую неустойчивость при резком подъеме из сидячего, горизонтального положения. В течение многих лет отмечает появление гнойных пробок в небных миндалинах		
Код МКБ10 по основному диагнозу	K29.6 Другие гастриты; K81.1 Хронический холецистит; K86.1 Другие хронические панкреатиты; K63.8 Другие уточненные болезни кишечника;		
Назначение (лекарственные препараты)	Таваник (левофлоксацин) 500 мг 1 т в сутки 10 дней, потом Фурамаг 50 мг по 1 т 3 раза 7 дней Уролесан 10 капель 3 раза на кусочек сахара 7 дней, потом Канефрон 2 т 3 раза 3 недели Энтерол 1 т 2 раза за 1 час до еды 6 дней		
Дата следующего приема	15-07-2017		
[12.3.1] ЭКГ	-		
Повреждения миокарда (ишемия, дистрофия, некрозы, рубцы)	не выявлено		
Нарушения ритма сердца	не выявлено		
Гипертрофия миокарда желудочков или предсердий	не выявлено		
Нарушения проводимости	не выявлено		
Заключение	ЭКГ признаки		
Число сердечных сокращений (ЧСС) в минуту	71		
Правильный ритм	правильный.		
Положение электрической оси сердца	срединное положение зос		
Ритм сердца	синусовый.		
Вольтаж	удовлетворительный.		
[39.10.1] Флюорография	-		

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Причина обращения или диагноз в соответствии с МКБ-10	K29.6 Другие гастриты; K81.1 Хронический холецистит; K86.1 Другие хронические панкреатиты; K63.8 Другие уточненные болезни кишечника;		
Краткий анамнез	ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА Положение обычное. Топографо-анатомическое соотношение щитовидной железы с мышцами и органами шеи не изменено. Форма не изменена. Размеры: перешеек - 3.7 мм. Правая доля: длина - 39 мм, толщина - 15 мм, ширина - 14 мм, объем - 3.9 см ³ . Левая доля: длина - 42 мм, толщина - 13 мм, ширина - 15 мм, объем - 3.9 см ³ . Общий объем - 7,8 см ³ , не увеличен. Контур ровные, четкие. Капсула не изменена, прослеживается на всем протяжении. Эхогенность паренхимы: смешанная. Структура evthtyuj диффузно-неоднородная. Сосудистый рисунок паренхимы в режиме ЦДК без особенностей. Очаговые образования: в левой доле коллоидные включения 3,5х2 мм + мелкие коллоидные включения до 2 мм в обеих долях, в правой доле сохраняется участок фиброза 7х5 мм Паращитовидные железы не дифференцируются. Региональные лимфатические узлы: не увеличены.		
Наименование медицинского оборудования	Комплекс диагностический подвижной КДП-1 с аппаратом рентгенографическим цифровым для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРГЦ-РП (ПроГраф)		
Вид рентгенологического исследования	Состояние удовлетворительное. Назначения: 1. В\В Гептрал 5 мл № 5 2. В\В глюконат кальция 10 мл № 5		
Анатомическая область	органы грудной клетки		
Первичное/вторичное исследование	первичное		