МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ МОЯ НАУКА
www.naykalab.ru

# Образец

| Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
|---|---|---|---|
| Профиль | | | |
| [1068] "Госпитализация" | | | |
| [253] Гепатит В - HBsAg | 0,1 | Коэффициент позитивности<br>отрицательный < 1.0<br>положительный > 1.0 | |
| Тест система: ДС-ИФА-HBsAg | | | |
| [260] Гепатит С - Анти-HCV суммарные | 0,1 | Коэффициент позитивности<br>отрицательный < 1.0<br>положительный > 1.0 | |
| Тест система: МилаЛаб-ИФА-АНТИ-HCV | | | |
| [501] Общий анализ крови (полный)(СОЭ,Le,Er,Hb,L-формула, тромбоциты, эритроциты) | результат: | | |
| гипохромия эритроцитов (+), анизоцитоз эритроцитов (+), пойкилоцитоз эритроцитов (+), микроцитоз эритроцитов (+) | | | |
| MO моноциты | 5 | 1,7-9,3% | |
| Базофилы | 0 | 0-1% | |
| LY лимфоциты | 29 | дети:25-60 %<br>взрослые:18-40% | |
| GR гранулоциты | 65 | 42,2 - 75,2% | |
| MO моноциты | 5 | 0-10 % | |
| MO# абсолютное содержание моноцитов | 0,6 | 0,1 - 0,6 x 10^9\л | |
| Тромбоциты (PLT) | 182 | 150 - 450 x 10^9\л | |
| Тромбокрит (PCT) | 0,20 | 0,19 - 0,36 % | |
| Ср. объем тромбоцита (MPV) | 8,1 | 6,5 - 12,0 fL | |
| Средний объем эритроцита (MCV) | 76,7 | 76 - 96,9 fL | |
| Гематокрит (HCT) | 41,3 | 35 - 48% | |
| Гемоглобин (HGB) | 147 | до1 года: 110 - 130 г\л<br>1-10 лет: 115 - 148 г\л<br>мужчины: 132 - 164 г\л<br>женщины: 115 - 145 г\л | |
| СОЭ по Вестергрену | 8 | 1-12 мес: 2 - 14 мм\ч<br>1-10 лет: 1 - 10 мм\ч<br>10 - 50 лет<br>женщины : 1 - 20 мм\ч<br>мужчины : 1 - 15 мм\ч<br>> 50 лет<br>женщины : 1 - 30 мм\ч<br>мужчины: 1 - 20 мм\ч | |

| Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
|---|---|---|---|
| Эритроциты (RBC) | 3,95 | до 2 нед.: 3,9 - 5,9 x 10^12\л<br>0,5-1 мес.: 3.3 - 5.3 x 10^12\л<br>1-4 мес.: 3.5 - 5.1 x 10^12\л<br>4-6 мес.: 3.9 - 5.5 x 10^12\л<br>6-9 мес.: 4.0 - 5.3 x 10^12\л<br>9-12 мес.: 4.1 - 5.3 x 10^12\л<br>1-3 года 3.8 - 4.8 x 10^12\л<br>3-6 лет 3.7 - 4.9 x 10^12\л<br>6 - 9 лет: 3,8 - 4,9 x 10^12\л<br>9 - 12 лет: 3,9 - 5,1 x 10^12\л<br>мужчины:<br>12-15 лет 4.1 - 5.2 x 10^12\л<br>15-65 лет 4.2 - 5.6 x 10^12\л<br>> 65 лет 3.8 - 5.2 x 10^12\л<br>женщины:<br>12-15 лет 3.8 - 5.0 x 10^12\л<br>15-65 лет 3.9 - 5.3 x 10^12\л<br>> 65 лет 3.8 - 5.2 x 10^12\л | |
| RDW анизоцитоз | 11,9 | 11,6 - 16,4 % | |
| RDWa Ширина распределения эритроцитов в абсолютных значениях | 58,9 | 30.0-150.0 | |
| Ширина распред. тромбоцитов (PDW) | 15,5 | 15,5 - 17,1 | |
| LPCR Макротромбоциты | 18,8 | 0,1-99,9% | |
| WBC лейкоциты | 4,9 | до1 года: 6,0 - 17,5 x 10^9\л<br>1-4 года: 5,5 - 15,5 x 10^9\л<br>4-19 лет: 4,5 - 13,5 x 10^9\л<br>взрослые: 4,50 - 9,00 x 10^9\л | |
| Ср. содержание гемоглобина (MCH) | 27,6 | 27 - 33 pg | |
| Ср. конц. гемоглобина в эр. (MCHC) | 324 | 310 - 370 г\л | |
| LY# абсолютное содержание лимфоцитов | 1,4 | 1,2 - 3,4 x 10^9\л | |
| GR# абсолютное содержание гранулоцитов | 3,2 | 1,4 - 6,5 x 10^9\л | |
| MO# абсолютное содержание моноцитов | 0,6 | 0,1-0,6x10^9\л | |
| Эозинофилы | 0 | дети: 0,5-7%<br>взрослые:0-5% | |
| миелоциты (нейтрофилы%) | 0 | 0% | |
| юные (нейтрофилы%) | 0 | 0% | |
| Нейтрофилы: палочк.(микроскопия) | 1 | 1-6% | |
| Нейтрофилы: сегмент.(микроскопия) | 64 | дети:25-65%<br>взрослые:45-70% | |
| Тест система: РеалБест РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, серия 9559, срок годности 22.10.2022 | | | |
| [506] Кровь на сифилис (реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном,антитела IgG и IgM к Treponema pallidum) | результат: | | |
| гипохромия эритроцитов (+), анизоцитоз эритроцитов (+), пойкилоцитоз эритроцитов (+), микроцитоз эритроцитов (+) | | | |
| Тест система: ДС-ИФА-АНТИ-ЛЮИС-СУММАРНЫЕ АНТИТЕЛА | | | |

| Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
|---|---|---|---|
| Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном | отрицательная | реакция отрицательная | |
| Антитела класса M и G к Treponema pallidum | 0,1 | Отрицательный - <0,90<br>Сомнительный - 0,90 - 1,10<br>Положительный - > 1,10 | |
| [507] Кровь на ВИЧ (для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена p24 ВИЧ-1 методом иммуноферментного анализа, версия 2.0) | Реакция отрицательная | реакция отрицательная | |
| [510] Общий анализ мочи | результат: | | |
| эритроциты (RBC) | 0-1 свежие | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| эп. неплоский (NEC) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| эп. плоский (SEC) | 1-2 | 0 - 2 в п\зр. | |
| дрожжевые грибки (YEA) | не обнаружено | не обнаружено | |
| гипохромия эритроцитов (+), анизоцитоз эритроцитов (+), пойкилоцитоз эритроцитов (+), микроцитоз эритроцитов (+) | | | |
| глюкоза (GLU) | не обнаружено | не обнаружено, 0 ммоль\л | |
| лейкоцитарные цилиндры (WBCT) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| зернистые цилиндры (GRAN) | не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| жировые цилиндры (FAT) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| кристаллы (CRY) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| фосфаты (CAPH) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| оксалаты (CAOX) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| мочекислый аммоний (AAU) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| кальций углекислый (CACB) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| кислый мочекислый натр (C5H3N) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| восковидные цилиндры (WAXY) | не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| ураты (AMOR) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| мочевая кислота (URIC) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| фосфорнокислый магний (MGPH) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| сернокислая известь (CASU) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| цилиндры | не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| эп. переходный (TREP) | не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| эп. почечный (REEP) | не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| сперматозоиды (SPRM) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| Модульная система для исследования общего анализа мочи Cobas u601+Cobas u701, Roche Diagnostics (США) | | | |
| относительная плотность (удельный вес) (SG) | 1.008 | 1,010 - 1,025 | |
| удельный вес | 1,005 | 1,010 - 1,025 | |
| лейкоциты (WBC) | 4-5 | мужчины: 0 - 3 в п\зр.<br>женщины: 0 - 5 в п\зр. | |
| соли | не обнаружено | не обнаружено или единичные кристаллы | |
| трипельфосфаты (TP04) (соли) | не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| гиалиновые цилиндры (HYA) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| слизь (MUC) | не обнаружено | не обнаружено | |
| патологические цилиндры (PAT) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| эритроцитарные цилиндры (RBCT) | не обнаружено | не обнаружено, 0 в п\зр. | |
| гемоглобин | не обнаружено | не обнаружено | |

| Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
|---|---|---|---|
| цвет (COL) | светло-желтая | оттенки жёлтого цвета | |
| прозрачность (CLA) | мутная | прозрачная | |
| pH | 5,0 | 5,0 - 7,0 | |
| белок (PRO) | не обнаружено | не обнаружено, 0 г\л | |
| билирубин (BIL) | не обнаружено | не обнаружено | |
| нитриты (NIT) | не обнаружено | не обнаружено | |
| кетоны (KET) | не обнаружено | не обнаружено | |
| Физико-химические показатели | | | |
| Микроскопическое исследование осадка мочи | | | |
| бактерии (BAC) | не обнаружено | не обнаружено | |
| уробилиноген (UBG) | 3,4 | 3,4 - 17,0 мкМ\л | |
| [512] АЧТВ | 28,9 | сек 27-45 | |
| [513] Группа крови | I | | |
| [514] Rh- принадлежность | положительный | | |
| [601] Общий белок | 78,4 | дети <1 года - 44 - 73 г/л<br>дети 1 - 2 года - 56 - 75 г/л<br>дети 2 года - 14 лет -60 - 80 г/л<br>> 14 лет -60 лет -64 - 83 г/л<br>> 60 лет -62 -81 г/л | |
| [605] Протромбиновый индекс (по Квику), МНО, протромбиновое время | результат: | | |
| протромбин | 89 | 80 - 120 % | |
| протромбиновое время | 15,8 | 11 - 14 сек | |
| МНО | 1,14 | 0,8 - 1,30 у здоровых лиц<br>2-3 при терапии пероральными антикоагулянтами | |
| [606] Фибриноген | 2,5 | 2-4 г\л | |
| [640] Глюкоза | 4,7 | 4,0 - 6,1 ммоль\л | |
| [649] Билирубин прямой | 2,0 | 0-5,1 мкмоль\л | |
| [650] Билирубин общий | 10,0 | взрослые: 5 - 21 мкмоль\л<br>дети: меньше 1 дня: 24-149 мкмоль\л<br>дети 1-3 дня: 58-197 мкмоль\л<br>дети 3-6 дней: 26-205 мкмоль\л<br>дети больше 6 дней: <21 мкмоль\л | |
| [651] АсАТ | 25,7 | < 5 дней- < 97 Ед/л<br>5 дней- 6 мес - < 77 Ед/л<br>6-12 мес - < 82 Ед/л<br>1-3 года - < 48 Ед/л<br>3 года-6 лет -<36 Ед/л<br>6-12 лет- <47 Ед/л<br>12-17 лет мужчины<29 Ед/л<br>12-17 лет женщины<25 Ед/л<br>>17 лет Женщины<31 Ед/л<br>>17 лет Мужчины<38 Ед/л | |
| [652] АлАТ | 14,9 | Дети:<br><5 дней - < 49 Ед/л<br>5 дней-6 мес - < 56 Ед/л<br>6 мес-12 мес- <54 Ед/л<br>1-3 года - < 33 Ед/л<br>3 года-6 лет- < 29 Ед/л<br>6-12 лет- < 39 Ед/л<br>12-17 лет мужчины:<27 Ед/л<br>12-17 лет женщины:<24 Ед/л<br>>17 лет Женщины<32 Ед/л<br>>17 лет Мужчины<40 Ед/л | |

| Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
|---|---|---|---|
| [661] Мочевина | 5,6 | 1 день - 30 дней 1,4-4,3 ммоль/л<br>1 мес. – 18 лет 1,8-6,4 ммоль/л<br>18 лет – 60 лет 2,1-7,1 ммоль/л<br>более 60 лет 2,50 - 8,32 ммоль/л | |
| [662] Креатинин | 88,0 | меньше 1 года 20 - 48 мкмоль/л<br>от 1 года - 14 лет 27 - 72 мкмоль/л<br>Женщины 53 - 106 мкмоль/л<br>Мужчины 71 - 115 мкмоль/л | |
| [683] Тромбиновое время | 9,7 | 10-20 сек | |